


CALEFIR[®]
Carfilzomib

**El inhibidor de proteosomas
QUE CAMBIA EL FUTURO
de los pacientes con
MIELOMA MÚLTIPLE
REFRACTARIO**



ingresar




Laboratorios
Aspen[®]

ESTUDIO CANDOR FASE 3

Las opciones de tratamientos para pacientes con mieloma múltiple (MM) continúan evolucionando y hay nuevos e importantes estudios. Para los pacientes con mieloma múltiple recaído/refractario, el estudio CANDOR probablemente tendrá implicancias y cambiará en un futuro cercano la práctica clínica.

Estudio multicéntrico randomizado de fase 3



Primary endpoint: PFS

Key secondary endpoints: ORR, MRD, and OS



CANDOR FPS

Prolonged PFS with CdD vs Cd (median: NR vs 15.8 mos; HR: 0.63; 95% CI: 0.46 -0.85; P=.0014)

Subgroup			Subgroup		
		HR CdD vs Cd (95% CI)			HR CdD vs Cd (95% CI)
ISS stage	1 or 2	0.61 (0.43-0.85)	Cytogenetic risk group	High	0.58 (0.30-1.12)
	3	0.71 (0.37-1.36)		Standard	0.55 (0.31-0.97)
Age at baseline	≤ 64	0.57 (0.38-0.86)		Unknown	0.72 (0.47-1.11)
	65-74	0.72 (0.43-1.20)	Number of prior therapies, n(%)	1	0.70 (0.42-1.17)
	≤ 75	0.97 (0.39-2.43)		≤ 2	0.63 (0.44-0.92)
Region	North America	0.04 (0.01-0.34)	Prior lenalidomide exposure	No	0.87 (0.56-1.35)
	Europe	0.86 (0.60-1.23)		Yes	0.52 (0.34-0.80)
	Asia Pacific	0.49 (0.25-0.93)	Refractory to lenalidomide	No	0.85 (0.57-1.27)
Baseline ECOG PS	0-1	0.69 (0.51-0.94)		Yes	0.45 (0.28-0.74)
	2	0.31 (0.08-1.19)	Prior proteasome inhibitor exposure	No	0.93 (0.93-3.02)
Baseline CrCl, mL/min.	≥ 15 to < 50	0.46 (0.21-1.02)		Yes	0.54 (0.47-0.88)
	≥ 50 to < 80	0.78 (0.45-1.33)	Refractory to bortezomib	No	0.59 (0.40-0.85)
		0.67 (0.44-1.02)		Yes	0.83 (0.49-1.41)

*HR < 1 favors CdD.

Referencia: Lancet. Oncol. 2022 Jan,23(1):65-76.
doi:10.1016/S1470-2045(21)00579-9. Epub 2021 Dec. 3.



**CALEFIR**[®]
Carfilzomib

INDICACIONES:

MIELOMA MÚLTIPLE REFRACTARIO O RECURRENTE: que recibieron 1-3 líneas de tratamiento.

- **CARFILZOMIB+ DEXAMETASONA (Cd)**
- **CARFILZOMIB+LENALIDOMIDA+DEXAMETASONA (CRd)**
- **CARFILZOMIB+DARATUMUMAB+DEXAMETASONA (DCd)**

Los siguientes estudios avalaron el uso de Calefir[®] en Mieloma Múltiple Refractario

- **ASPIRE**
- **ENDEAVOR**
- **ARROW**
- **CANDOR**
- **EQUULEUS**