UVEREN®
macitentan

TARJETA DE ALERTA PARA EL PACIENTE

MACITENTAN 10 MG - COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Nombre del paciente: _____

Fecha de nacimiento: _____

Dirección del paciente: _____

Teléfono del paciente: _____

PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que necesita conocer si recibe tratamiento con UVEREN. Lleve siempre consigo esta tarjeta y muéstresela al médico que le atienda.

Es importante que informe inmediatamente al médico prescriptor de cualquier embarazo o efecto adverso que pueda producirse durante el tratamiento con UVEREN.

Centro de tratamiento: _____

Nombre del médico prescriptor: _____

Número de teléfono del médico prescriptor: _____

Firma del paciente: _____

Aclaración: _____

Laboratorios Aspen®

EMBARAZO Y ANTICONCEPCIÓN

EMBARAZO:

UVEREN puede afectar de forma negativa al desarrollo del feto. Por tanto, no debe tomar UVEREN si está embarazada y tampoco debe quedarse embarazada mientras tome UVEREN. Además, si padece hipertensión arterial pulmonar, el embarazo puede deteriorar en gran medida los síntomas de su enfermedad. Se ha demostrado de manera fehaciente que Macitentan tiene efectos teratogénicos al ser administrado a animales.

ANTICONCEPCIÓN:

Deberá utilizar un método anticonceptivo fiable para el control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con UVEREN. Consulte con su médico ante cualquier duda que pueda tener.

Debe realizar pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento con UVEREN y mensualmente durante el tratamiento, incluso si piensa que no está embarazada.

ANÁLISIS DE SANGRE REGULARES

Del mismo modo que otros medicamentos de esta clase, UVEREN puede inducir anemia (reducción del número de glóbulos rojos) y puede afectar al hígado. El médico le realizará análisis de sangre antes de que comience el tratamiento con UVEREN y durante el tratamiento para determinar:

- Si tiene anemia (reducción del número de glóbulos rojos)
- Si el hígado funciona correctamente

Los signos indicativos de que el hígado puede no estar funcionando correctamente son:

- Náuseas (necesidad de vomitar)
- Vómitos
- Fiebre (temperatura elevada)
- Dolor de estómago (abdomen)
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos)
- Orina de color oscuro
- Picor en la piel
- Letargo o fatiga (cansancio o agotamiento inusuales)
- Síndrome pseudogripal (dolor articular o muscular con fiebre)

SI EXPERIMENTA CUALQUIERA DE ESTOS SIGNOS, INFORME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE.

La dosis recomendada de UVEREN es de un comprimido de 10 mg una vez al día. Trague el comprimido entero, con un vaso de agua y no lo mastique ni lo rompa. UVEREN puede tomarse con o sin alimentos. Si olvida tomar UVEREN, tome una dosis en cuanto lo recuerde y, a partir de entonces, siga tomando los comprimidos a las horas habituales. No tome una dosis doble para compensar el comprimido olvidado. Para obtener más información sobre UVEREN, lea detenidamente la hoja de información al paciente. Si tiene alguna duda sobre su tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico.