




Indicado para el
tratamiento de la
Enfermedad de Gaucher
y Niemann-Pick



**NUEVO
LANZAMIENTO**

ingresar



El ensayo fundamental de **Glitir**[®] se realizó en pacientes que no podían o no querían recibir TES. Los motivos para no recibir la TES incluían el inconveniente que suponen las infusiones intravenosas así como las dificultades de conseguir adecuado acceso venoso.

Resultados a los **12** meses del estudio



28 pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 leve o moderada,
de los cuales 22 completaron el estudio.



El 50% de los pacientes optaron por continuar su tratamiento con **Glitir**[®] en el contexto de un protocolo de tratamiento a largo plazo.

Resultados a los **36** meses del estudio





Pacientes adultos con la **Enfermedad de Gaucher tipo 1**

Dosis inicial: 100 mg 3 veces al día



Pacientes adultos con la **Enfermedad de Niemann-Pick tipo C**

Dosis inicial: 200 mg 3 veces al día



Pacientes pediátricos con la **Enfermedad de Niemann-Pick tipo C**

Dosis inicial: 200 mg 3 veces al día, pacientes > 12 años

- pacientes < 12 años deberá ajustarse la dosis en base al área de superficie corporal






Indicaciones:



- 1 Como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad de **Gaucher tipo 1** de leve a moderada.

- 2 Tratamiento de la **enfermedad de Niemann-Pick, tipo C**.



Presentación:

100 mg (Miglustat)
x 90 cápsulas.

