



Plan de Minimización de Riesgos para Pacientes SIN Capacidad reproductiva

Información importante al iniciar el tratamiento con IDAMIDA (Pomalidomida):

La Pomalidomida está relacionada estructuralmente con la Talidomida. La Talidomida es un principio activo con acción teratógena conocida en humanos, que causa defectos congénitos de nacimiento graves que pueden poner en peligro la vida del niño. Si se toma Pomalidomida durante el embarazo, no puede descartarse un efecto teratógeno de Pomalidomida.

Acciones a tener en cuenta sobre el Plan de Prevención de Embarazos (PPE):

- Antes de comenzar el tratamiento, el médico ha comprobado que no tengo capacidad de quedar embarazada.

Información adicional:

Notificar al médico si presenta síntomas como:

- Respiración entrecortada.
 - Dolor torácico.
 - Edema de las extremidades.
 - Hemorragias (incluyendo hemorragia nasal, en boca y encías).
 - Fiebre.
 - Hematomas.
-
- No fumar durante el tratamiento.
 - Realizarse controles de presión periódicos.
 - Mantener una dieta moderada (ni sobrepeso, ni delgadez extrema).
 - No compartir las cápsulas con nadie.
 - Al finalizar el tratamiento, devolver al médico las cápsulas sobrantes.



(+54 11) 4637-6367
Fax: (+54 11) 4611-3637



farmacovigilancia@aspen-lab.com
www.aspen-lab.com



Remedios 3439/43
C. P.: C1407HJC - C.A.B.A.



Nuestro Valor es la Salud